

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

次の部位には使用しないでください

- (1) 顔面、特に目や目の周囲、粘膜(例えば、口腔、鼻腔、膣等)、やわらかい皮膚面(首の回り、胸部、わきの下、うでの内側等)、陰のう、外陰部等。
- (2) 炎症又は傷のある患部。
- (3) ロウ様光沢があり、押すと白いものが出てくる水イボ、お年寄りにできやすい黒褐色の扁平イボ、群生したイボ。

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 乳幼児。
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状が現れた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書きをもって医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

保管および取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手のとどかないところに保管してください。
- (3) 誤用を避け品質を保持するため、他の容器に入れ替えないでください。
- (4) 火気に近づけないでください。
- (5) 使用期限をすぎた製品は使用しないでください。

上段:使用期限 下段:製造番号

製造販売元
福地製薬株式会社
滋賀県蒲生郡日野町寺尻824

お客様相談窓口
電話 0748-52-2323
受付時間 9:00~17:00
(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度
電話 0120-149-931

イボチョン

イボ タコ 魚の目



10mL

第2類
医薬品

開封口

第2類医薬品

本剤のご使用前に、この説明書きを必ずお読みください

内容量:10mL(8.7g)
販売名:イボチョン
成分・分量(100g中)
サリチル酸.....15g
添加物 ピロキシリン、エーテル、アセトン、ヒマシ油、エタノール、乳酸、dl-カンフル

効能・効果:
いぼ、たこ、うおのめ

用法・用量:
1日数回添付の棒にて患部に適量を塗布してください

用法及び用量に関する注意

- (1) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 本剤は外用のみに使用し、内服はしないでください。
- (4) 本剤が患部の周りの皮膚につかないよう、よく注意して使用してください。