使用前にこの説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

鎮咳去痰薬

第2類医薬品

つらいせき、たんをおさえる

ルルダイレクトS錠

ルルダイレクトS錠の特徴

1. 2種の鎮咳成分ジヒドロコデインリン酸塩とノスカピンがせき中枢にはたらいてつらいせきをしずめます。
2. *dl*-メチルエフェドリン塩酸塩が気管支をひろげて呼吸を楽にし、つらいせきをしずめます。
3. クロルフェニラミンマレイン酸塩がアレルギー性のせきをしずめます。
4. L-カルボシステインが、気道粘膜を正常な状態にし、せきの原因の1つである、たんを出しやすくします。
5. 携帯に便利なPTP包装です。

使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください。
   (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
   (2) 12歳未満の小児
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。
   他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等
   (鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。
   (眠気等があらわれることがあります)
4. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。
5. 過量服用・長期連用しないでください。

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
   (1) 医師の治療を受けている人
   (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人　(3) 高齢者
   (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
   (5) 次の症状のある人
   高熱、排尿困難
   (6) 次の診断を受けた人
   心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、肝臓病、甲状腺機能障害、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌尿器	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。
呼吸抑制	息切れ、息苦しさ等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
   便秘、口のかわき、眠気
4. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

せき、たん

用法・用量

次の量を水又はお湯で服用してください。

年　齢	1回量	1日服用回数
成人（15歳以上）	2錠	3回 食後に服用してください。
12歳以上15歳未満	1錠	
12　歳　未　満	服用しないでください。	

〈用法・用量に関連する注意〉

(1) 用法・用量を厳守してください。

(2) 12歳以上の小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

(3) 錠剤の取り出し方

右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。
(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります)



成分・分量

本剤は白色のフィルムコーティング錠で、6錠中に次の成分を含有しています。

成　分	分　量	はたらき
ジヒドロコデインリン酸塩	24mg	せき中枢にはたらき、せきをしずめます。
ノスカピン	60mg	
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	75mg	気管支をひろげ、せきをしずめます。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	12mg	アレルギー性のせきをしずめます。
L-カルボシステイン	750mg	気道粘膜を正常な状態にし、せきの原因の1つであるたんを出しやすくします。

添加物：セルロース、乳糖、ヒドロキシプロピルセルロース、硬化油、無水ケイ酸、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、酸化チタン、タルク、カルナウバロウ

保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。

(2) 小児の手の届かない所に保管してください。

(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)

(4) 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。また、アルミ袋を開封した後は、12カ月以内に使用してください。

(5) 箱の「開封年月日」記入欄に、アルミ袋を開封した日付を記入してください。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

第一三共ヘルスケア株式会社　お客様相談室

〒103－8234　東京都中央区日本橋3－14－10

電　　話　0120－337－336

受付時間　9：00～17：00（土、日、祝日を除く）

ルルについて詳しくは　www.lulu.jp

01 ®登録商標

販売元
Daiichi-Sankyo
第一三共ヘルスケア株式会社
東京都中央区日本橋3－14－10

製造販売元
滋賀県製薬株式会社
滋賀県甲賀市甲賀町滝879番地

ホームページ　https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/