

服用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

一かぜ薬一 **ジキニン[®]C細粒**

第2類医薬品

販売名：ジキニンC細粒

- アセトアミノフェンをはじめ、8つの有効成分がかぜの諸症状（発熱、のどの痛み、鼻水、鼻づまり、せき、たんなど）を緩和します。
- かぜの回復を助けるビタミンCを配合した溶けの良い細粒です。

【使用上の注意】

してはいけないこと



（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる。）

1. 次の人は服用しないでください。
(1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(2)本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
(3)12才未満の小児。
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。
他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。
（眠気等があらわれることがある。）
4. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。
5. 服用前後は飲酒しないでください。
6. 過量服用・長期連用しないでください。

相談すること



1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1)医師又は歯科医師の治療を受けている人。
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3)高齢者。
(4)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(5)次の症状のある人。高熱、むくみ、排尿困難
(6)次の診断を受けた人。甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌尿器	排尿困難
その他	過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック （アナフィラキシー）	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 （スティーブンス・ジョンソン症候群）、 中毒性表皮壊死融解症、 急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ（小膿疱）が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
薬剤性過敏症症候群	皮膚が広い範囲で赤くなる、全身性の発疹、発熱、体がだるい、リンパ節（首、わきの下、股の付け根等）のはれ等があらわれる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

〔表面からのつづき〕

腎障害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛（節々が痛む）、下痢等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。
呼吸抑制	息切れ、息苦しさ等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

便秘、口のかわき、眠気

4. 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能・効果】

かぜの諸症状（発熱、のどの痛み、鼻水、鼻づまり、せき、たん、頭痛、くしゃみ、悪寒（発熱によるさむけ）、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和

【用法・用量】 次の量を食後なるべく 30 分以内に服用してください。

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
成人(15才以上)	1 包	3 回
12才以上 15才未満	2 / 3 包	
12才未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
(2) 本剤は水又はぬるま湯で服用してください。

【成 分】(3包中)

成 分	分 量	は た ら き
アセトアミノフェン	900 mg	発熱やのどの痛みを緩和します。
<i>d</i> -クロルフェニラミン マレイン酸塩	3.5 mg	鼻水、くしゃみなどのアレルギー症状を抑えます。
ジヒドロコデインリン酸塩	24 mg	せき中枢に働き、せきを鎮めます。
<i>dl</i> -メチルエフェドリン塩酸塩	60 mg	気管支を拡張し、せきを鎮めます。
カンゾウ(甘草)エキス粉末	288 mg (原生薬換算量2,250mg)	炎症を抑え、せき、たんを緩和します。
無水カフェイン	75 mg	頭痛を緩和します。
アスコルビン酸(ビタミンC)	500 mg	かぜの回復を助けます。
リボフラビン(ビタミンB ₂)	12 mg	かぜのときに消耗しやすいビタミンを補います。

添加物としてタルク、ヒドロキシプロピルセルロース、D-マンニトール、香料、スクラロース、ステアリン酸 Mg、ステビア抽出物、タウマチン、無水ケイ酸を含有します。

〈成分に関連する注意〉

本剤の服用により尿が黄色くなることがありますが、これは本剤中のリボフラビン(ビタミンB₂)によるものですので、ご心配ありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光のあたらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
(2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
(3) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
(4) 1 包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2 日以内に服用してください。
(5) 使用期限を過ぎた製品は、服用しないでください。

問い合わせ先

- 1) お買い求めのお店
2) 全薬お客様相談室
電 話：03 (4476) 8030
受付時間：9:00～17:00(土・日・祝日を除く)

製造販売元 **全薬工業株式会社**

東京都文京区大塚5-6-15
<https://www.zenyaku.co.jp>