



開封年月日
年　月　日
開封時に記入してください

使用方法


①容器のフタをはずしてください。


②「アー」と声を出しながら頭部を押して、患部に薬液を2～3回直射してください。
※最初は薬液が出るまで4～5回押してください。
※薬液がノズルの先端にたまった時は、液だれを防ぐため清潔なティッシュペーパー等で拭き取ってください。


③使用後は、フタをもとの位置にはめてください。


ノズルの先端を針等で突くと薬液が出にくくなったり、折れた時大変危険です。絶対におやめください。

©2026 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.



ヒヤ のどスプレーAZ

第3類医薬品

育児に笑顔を ひや・きおーがん

口腔咽喉薬

のどの痛み・声がれ



ヒヤ すみっコぐらし™ のどスプレーAZ

小児から大人まで

抗炎症成分配合

アズレンスルホン酸ナトリウム水和物



シュガーレス ぶどう味



第3類医薬品

30mL

紙 箱

4 987192 003292

外装フィルム：PP

製造番号

使用期限

第3類医薬品

ヒヤのどスプレーAZ

効能・効果 のどの炎症によるのどあれ・のどの痛み・のどのはれ・のどの不快感・声がれ、口内炎

成分・分量　（本剤1mL中）	
アズレンスルホン酸ナトリウム水和物（水溶性アズレン）	0.2mg

添加物としてグリセリン、還元麦芽糖水アメ、プロピレングリコール、クエン酸、クエン酸Na、エタノール、パラベン、*dl*-メントール、pH調整剤、香料を含有する。

保管及び取り扱い上の注意

（1）直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。（2）小児の手の届かない所に保管してください。（3）他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わる場合があります。）（4）薬液が衣服等に付着すると着色します。付着した場合はすぐに水でよく洗い落としてください。（5）ノズルの先端の穴を針等で突かないでください。使用時に薬液が出にくくなることがあります。（6）火気に近づけないでください。（7）使用期限を過ぎた製品は、使用しないでください。（8）本品使用後の一定時間は、呼気中に酒気帯び運転と判定される濃度以上のアルコール濃度が検出される可能性がありますので、運転中のご使用はお控えください。

〈発売元〉 **樋屋奇応丸株式会社**
大阪市北区天満1丁目4番11号
お問い合わせ先：072-871-2990

製造販売元：ダイヤ製薬株式会社
〒634-0803　奈良県橿原市上品寺町515

副作用救済制度　☎0120-149-931

LICENSED BY San-X™
FOR SALE IN JAPAN ONLY
日本国内限定銷售品

San-X LICENSED PRODUCTS ©San-X

2512A01

開封口

販売名：ヒヤのどスプレー AZ

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

⚠ 使用上の注意

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
（1）医師又は歯科医師の治療を受けている人。
（2）口内のただれがひどい人。
（3）薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症　状
皮ふ又は口腔	発疹・発赤、かゆみ又は刺激感

（1）症状が悪化した場合。
3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

用法・用量

1日数回適量を患部に噴射塗布してください。

〈用法・用量に関連する注意〉
（1）定められた用法・用量を守ってください。
（2）息を吸いこみながら使用すると、薬液が気管支や肺に入ることがありますので、ノズルをのどの患部にむけて、軽く息をはきながら、2～3回噴射してください。
（3）塗布にのみ使用し、内服しないでください。
（4）小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
（5）目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐ水またはぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。

第3類医薬品